

Verslag excursie plantenwerkgroep Kamperzeedijk d.d. 17 mei 2010

Op maandagavond staan er 7 mensen in de Groenestraat om onder leiding van Niels Jeurink in de omgeving van Kampen planten te inventariseren. Niels kiest als startpunt de berm langs de Kamperzeedijk, ter hoogte van Grafhorst, aan de kant van de Koekoekspolder. Zeer, zeer langzaam met alle neuzen naar beneden gericht lopen we enkele meters door de berm. We geven aan Niels door welke planten we herkennen, zodat hij deze op zijn inventarisatielijst kan aanstrepen. Iedereen heeft daarin zijn bijdrage. Datgene wat we niet weten, wordt ons door Niels uitgelegd aan de hand van specifieke kenmerken van de plant. Er staat teveel om hier op te noemen, wel nog even vermeld dat de gele morgenster in opvallende aantallen aanwezig is.




Twee jongens van een jaar of 11 fietsen een paar keer langs onze groep. “Wat zijn jullie aan het doen?” We bekijken planten”, delen we hen mede, waarop 1 van de jongens vertelt: “Ik ben een herbarium aan het maken “. We nodigen hem meteen enthousiast uit om mee te lopen, waarop direct zijn reactie : “Maar ik ben het nu al spuugzat !” Hij had nog geen weegbree; daar konden we hem in ieder geval aan helpen. We hopen, dat hij later toch net zo’n goede herinneringen aan onze flora heeft als de deelnemers van de excursie.



“Vroeger zogen we de honing uit de witte dovenetels en knabbelde we op de zuring” Vogelmuur noemden we murre en gestreepte witbol pyjamagrass. Vlier is heerlijk op pannenkoeken, Ook het chinees breiwerk is bekend. Deze leuke informatie voegt iets extra’s toe.

Op de vraag of een bepaalde plant eetbaar is, geeft Niels zeer nuttige informatie: “Alles is eetbaar, minstens 1 keer”

Voorbij de slipbladige ooievaarsbek, ijle dravik, veldsla, vertakte leeuwentang en bij het raapzaad (raapolie) slaan we rechtsaf het weiland in. We lopen langs de sloot, waar we klein kruiskruid, blaartrekkende boterbloem, klimop ereprijs, kluwenhoornbloem, koninginnekruid, bosveldkers vinden. Dwars op de sloot loopt een smalle diepe geul waar kwelwater door stroomt.



De Koekoekspolder (-2.5 tot -3 NAP) is het laagste gedeelte van de Mastenbroekerpolder. Gedurende 2 eeuwen werd er veen gewonnen en in 1909 werd het weer ingepolderd. De Koekoekspolder ligt diep. Er is wel 6 keer zoveel kwelwater (10-25 mm/dag), als regenwater. Het kost dan ook veel energie om de polder droog te houden.

Op het kwelwater drijft een olie-achtig laagje. Toch is dit geen olie, want wanneer er een steentje in gegooid wordt blijft er een opening in de laag zichtbaar. Bij olie zou deze opening zich weer sluiten.



Langs dit water vinden we o.a. oranje havikskruid, scherpe zegge, oeverzegge, ruige zegge, liesgras en het prille begin van valeriaan. Het begint kouder en donker te worden, dus we besluiten om weer richting Grafhorst te gaan. Langs een slootkant staat nog een reuzenbereklaauw (uit Azië) naast onze gewone bereklaauw. Zoek de verschillen !

We lopen nog even door het dorpje Grafhorst. Oeps, foutje ! Grafhorst kreeg in 1333 stadsrechten. In 1849 verwoestte een brand vrijwel de gehele stad. Slechts drie van de 60 gebouwen stonden na de brand nog overeind. Vanwege de grootte wordt het meestal aangeduid als dorp.

In het stadje Grafhorst vinden we o.a. vetmuur, late vroegeling, zandraket (genetisch onderzoek heeft aangetoond dat deze plant een zeer snelle levensloop heeft. Gaat dus met recht als een raket door zijn leven heen) kleine veldkers, herik en na ridderzuring, krulzuring, veldzuring, nummer 4 van deze avond: schapezuring. Totaal 107 soorten zijn we deze avond tegengekomen. Niet gek !
Tevreden fietsen we huiswaarts.

Tekst: Ellen Diender- van Knippenberg

Foto's: Heleen Strikkers